# AVERTISSEMENTS

# DLP 18-6-69 943264

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE: 12 automatic not an

EDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, Route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-ET-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÉVRE

Regisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. 10000 3465 (2/K)

Supplément n° 1 au Bulletin n° 105 - JUIN 1969

16 JUIN 1969

# VIGNE

HILDIOU: Une grande partie du vignoble de Bourgogne et Franche-Comté a subi de très violents orages les 13 - 14 et 15 Juin. Les vignes ayant été traitées avant le 13 ont été en partie protégées. Dans celles n'ayant subi à cette date que un à deux traitements, il faut s'attendre à une forte invasion de mildiou sur feuilles et sur grappes à partir des 2I et 25 Juin.

En conséquence, dès que l'état du terrain le permettra, poursuivre le relevage et l'attachage de la vigne ; ces opérations terminées, appliquer sur tout le vi-moble un traitement avec beaucoup de soins avant le 20 de ce mois, la floraison étant proche et même commencée dans le Hâconnais et le Beaugolais.

OIDIUM - VERS DE LA GRAPPE : Renouveler les traitements.

## ARBRES FRUITIERS

CARPOCAPSE DES POINTES & POIRES : Les premières et rares pénétrations se sont produites dans le verger ces derniers jours. Les nombreuses pontes déposées au début de la semaine arrivent à éclosion ; en conséquence, effectuer un premier traitement à l'aide d'un insecticide (voir liste), additionné de fongicides anti-oïdium et anti-tavelure.

MOUCHE DE LA CERISE : Appliquer une première pulvérisation sur les variétés habituellement attaquées, Marmotte notamment, lorsque les premiers fruits commencent à se colorer. Une deuthème application est à prévoir une dizaine de jours après la première. Respecter les délais d'emploi avant récolte :

> - Diméthoate, Formothion..... 7 jours - D.D.T., Diazinon, Fenthion, Oléoparathion ..... 15 jours

> - Endothion ..... 2I jours

### POMIES DE TERRE

MILDIOU: Etendre le traitement à toutes les variétés.

DORYPHORE : Des pontes ont été déposées, survoiller les cultures ; effectuer un traitement dès que les larves atteignent la grosseur d'un grain de blé.

#### CULTURES LEGULITHESES

MILDIOU DE L'OIGNON - SEPTORIOSE DU CELERI : Renouvelor les traitements.

### HOUBLONS

Les traitements ayant été lavés par les fortes pluies, un traitement très soigné s'impose des que possible.

N.B. Nous rappelons qu'il est utile de renouveler dans tous les cas les traitements après chaque précipitation importante ou orageuse.

Les Ingénieurs - Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie - Inspectour de la Protection des Végétaux - Circonscription phytosamitaire "DOURGOCER & FRANCHE-CO. TE": H. SOULIE.

Ingrimerie de la Station Bourgogne et Franche-Comté-Le Directour-Gérant : L. BOUYX.